



Head Lice Fact Sheet — No.1

What are lice?

1. Lice, or Pediculosis (pe-dic-u-lo-sis), are small tan to grayish-white insects, about the size of a sesame seed, have six legs.
2. They don't usually carry disease, but can cause your child and family discomfort, stress and sometimes skin irritation.
3. Lice can live up to 30 days on a person's head and lay from 50 to 150 eggs. To live, adult lice need to feed on blood every 3 to 6 hours. If the louse falls off a person, it dies within 2 days.
4. There are three types of lice: head, body and crab lice. Body lice haven't been reported in Texas for years. Head lice and crab lice are common but not usually found at the same time on a person.





Here's where they can hide:

- Head lice live on the head and rarely leave the body.
- Body lice live in the seams and linings of clothing, blankets and sheets and move to the body when feeding.
- Crab lice live on the hairy portions of the body. They like the pubic and anal areas; but, only on adults. Adults who have pubic lice should be examined for sexually transmitted diseases (STDs). Even though crab lice and STDs aren't related, both conditions may be present at the same time. Children rarely get crab lice. However, if a child has it, you may want to suggest an examination for possible signs of inappropriate contact.

¿Qué son los piojos?

1. Los piojos, también conocidos como pediculosis (pe-di-cu-lo-sis), son insectos pequeños entre color habano y blanco grisáceo, casi del tamaño de una semilla de ajonjolí, con seis patas.
2. Por lo general no son portadores de enfermedades pero pueden causar a su hijo y a su familia molestia, estrés y a veces irritación de la piel.
3. Los piojos pueden vivir hasta 30 días en la cabeza de una persona y ponen de 50 a 150 huevos. Para vivir, los piojos adultos necesitan alimentarse de sangre cada 3 a 6 horas. Si el piojo se cae de la persona, muere en los 2 días siguientes.
4. Hay tres tipos de piojos: los piojos de la cabeza, los del cuerpo y los del pubis. No se ha informado de piojos del cuerpo en Texas en años. Los piojos de la cabeza y los piojos del pubis son comunes pero por lo general no se encuentran en la misma persona al mismo tiempo.



Se pueden esconder en los siguientes lugares:

- Los piojos de la cabeza viven en la cabeza y raramente se van del cuerpo.
- Los piojos del cuerpo viven en las bastillas y el forro de la ropa, las cobijas y las sábanas y se van al cuerpo cuando se alimentan.
- Los piojos del pubis viven en las partes velludas del cuerpo. Les gusta el área púbica y anal pero sólo en los adultos. Se debe examinar a los adultos que tengan piojos del pubis por si tuvieran enfermedades venéreas. No obstante los piojos del pubis y las enfermedades venéreas no están relacionados, ambas enfermedades podrían estar presentes al mismo tiempo. Los niños rara vez tienen piojos del pubis. Sin embargo, si un niño los tiene, quizá quiera sugerir que lo examinen para ver si tiene signos de contacto inapropiado.